



USO DE ADHESIVOS TISULARES CON BASE DE CIANOACRILATO COMO ALTERNATIVA A LA SUTURA CONVENCIONAL EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Autoras: Marta Cámara Castresana, Teresa Domínguez López
EIR Enfermería Pediátrica; Hospital Puerta del Mar, Cádiz

INTRODUCCIÓN

Las **lesiones traumáticas** son una causa frecuente de consulta en urgencias pediátricas, habitualmente por caídas, golpes o accidentes domésticos. Su cierre suele realizarse con suturas, grapas o tiras adhesivas, técnicas que pueden generar dolor y ansiedad.

En los últimos años, el uso de **adhesivos tisulares** ha aumentado como alternativa menos invasiva, aunque persisten dudas sobre sus resultados estéticos.

La **enfermera pediátrica** tiene un rol clave en la atención de estas heridas, al intervenir en su cierre y en la reducción del dolor y la ansiedad, valorando la opción más adecuada para cada caso.

OBJETIVOS

Analizar la efectividad del **cianoacrilato** para el cierre de heridas en pediatría frente a las suturas convencionales.

METODOLOGÍA

PubMed®



Google Académico

① **Revisión bibliográfica:**

② **Estrategia de búsqueda:**

CIANOACRILATO **AND** SUTURA **AND** HERIDA **AND** PEDIATRÍA
OR ADHESIVO TISULAR

③ **Criterios de inclusión:**

- Idioma
- Fecha de publicación
- Acceso gratuito al texto completo

④ **Criterios de exclusión:**


- Población adulta
- Diseño no experimental
- No comparativo

RESULTADOS

ADHESIVO TISULAR




SUTURA CON HILO



Los estudios revisados muestran **buenos resultados** tanto en el grupo tratado con adhesivo tisular como en el que recibió sutura con hilo.

TIEMPO, COSTE Y SATISFACCIÓN



😊 **+ satisfacción** en el grupo con adhesivo.
⬇️ **dolor** reportado con el adhesivo tisular.

CONCLUSIONES

Ambas técnicas tienen **resultados satisfactorios** a largo plazo con una **tasa mínima de complicaciones**.

El uso de adhesivos con base de **cianoacrilato** se ha demostrado seguro, eficaz y mejor valorado por los pacientes pediátricos, con menor necesidad de anestesia, reducción del tiempo asistencial y menor coste sanitario.

La **enfermería pediátrica** debe estar formada y capacitada para identificar casos candidatos al uso de adhesivo, favoreciendo así una atención menos invasiva y más humanizada.



BIBLIOGRAFÍA

