

# CONOCIMIENTOS PATERNOS SOBRE LA BRONQUIOLITIS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 2022-2023

Barrera Delgado E<sup>1</sup>; Tadeo Suárez JC<sup>2</sup>; Mesa Medina O<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Enfermera Especialista en Enfermería Pediátrica. Hospital de Día Pediátrico. <sup>2</sup>TCAE. Hospital de Día Pediátrico. <sup>3</sup>FEA de Pediatría. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife

## 1. INTRODUCCIÓN

La bronquiolitis es la infección respiratoria más frecuente en niños menores de un año y supone el 18% de las hospitalizaciones pediátricas. El virus aislado con más frecuencia es el virus respiratorio sincitial. El diagnóstico de la bronquiolitis es fundamentalmente clínico. Las infecciones por VRS afectan al 75% de los lactantes en su primer año de vida.

Los síntomas principales son la congestión nasal, moqueo y en ocasiones fiebre. Su tratamiento es sintomático mediante oxigenoterapia o aspiración de secreciones. La prevención no farmacológica consiste en higiene de manos, evitar ambientes con humo, promover la lactancia materna... La administración mensual de palivizumab por vía intramuscular es la principal prevención farmacológica.

Informar adecuadamente a los padres reduce la carga sanitaria.

## 2. OBJETIVO

Describir la intervención enfermera durante la campaña de prevención de la bronquiolitis 2022-2023 en lactantes en el Hospital de Día Pediátrico del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

## 3. METODOLOGÍA



**DISEÑO:** Estudio observacional, descriptivo y prospectivo.

**SUJETOS:** Lactantes de riesgo: prematuridad, cardiopatía, neumopatía y alteraciones neurológicas incluidos en la campaña 2022-2023.

**INSTRUMENTALIZACIÓN:** Mediante intervención enfermera (telefónica o presencial) se realiza un cuestionario no validado para valorar los conocimientos familiares acerca de la bronquiolitis, su prevención y tratamiento. En cada administración mensual de palivizumab se refuerzan los conocimientos. Finalizada la campaña, se hace un cuestionario sobre los efectos secundarios y la percepción global del procedimiento.

## 4. RESULTADOS

- 40 lactantes inmunizados.
- Edad: 6,9±5,9 meses.
- 52% sexo masculino frente al 48% femenino.
- Sólo 12,5% precisaron refuerzo de la información.
- 100% de adherencia al tratamiento (sólo 1 caso se planteó no administrar palivizumab).
- Tras administrar tratamiento, la mayoría presentan síntomas sistemáticos leves.
- Ningún paciente se infectó por VRS.



## 5. CONCLUSIONES

Potenciar las campañas de concienciación mediante información fácil de comprender en diversos formatos es necesario para aumentar los conocimientos de la población, aunque no hay consenso sobre quién debe proporcionar dicha información. La intervención enfermera en la campaña de prevención de bronquiolitis 2022-2023 fue efectiva y bien recibida. Se concluye que la mayoría de los padres tenían conocimientos previos sobre la enfermedad y su prevención. Proporcionar recomendaciones sobre el seguimiento en casa disminuye la ansiedad tras la hospitalización. La adhesión al tratamiento fue del 100%.

## 6. BIBLIOGRAFÍA

