

# PERCEPCIÓN DE ENFERMERAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA ASISTENCIA A MENORES CON PATOLOGÍA CRÓNICA Y COMPLEJIDAD Y/O NECESIDADES PALIATIVAS

Aiora Mayoz Elicegui <sup>1</sup>; Cristina Vaamonde García <sup>2</sup>; Idoia Serrano Pejenaute <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Centro de Salud de Tolosa (Guipúzcoa) - Osakidetza

<sup>2</sup> Subdirección para la coordinación de atención primaria de Osakidetza

No existe ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación



## INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Los avances de la medicina han permitido reducir la mortalidad y aumentar la supervivencia de los niños, niñas y adolescentes (NNA) con patologías crónicas y complejidad (PCC), produciendo cambios en el perfil y necesidades de los pacientes pediátricos. La atención primaria y en concreto los profesionales de enfermería tienen un papel importante en la asistencia a este colectivo.

El objetivo del estudio es analizar la percepción de enfermeros/as de atención primaria sobre la asistencia a NNA con PCC y/o necesidad de cuidados paliativos (CP), comparando enfermeras especialistas en pediatría (EEP) con enfermeras generalistas (EG).

## METODOLOGÍA


Estudio observacional descriptivo realizado en enero-marzo de 2025, sin financiación externa.

- Recogida de datos:** mediante un cuestionario *ad hoc*, auto-cumplimentado voluntariamente de forma online. Se median datos de filiación, conocimientos y la autopercepción en capacitación técnica.
- Población de estudio:** 310 enfermeros/as de atención primaria de pediatría del servicio público de salud de la Comunidad Autónoma Vasca.

## RESULTADOS



**TOTAL:**  
**90 respuestas**



■ Enfermera especialistas en pediatría  
■ Enfermera generalista


**46,7% (42): Formación** previa en CPP.

**18,8% (17): Se sienten cómodos** para atender NNA con PPC y/o necesidades paliativas.

**31,3%**  
**EEP**

**12%**  
**EG**

Se sienten **cómodos** atendiendo a este colectivo



**Diferencias estadísticamente significativas (p<0,05)**

## CONCLUSIONES

La mayoría de las enfermeras de atención primaria no se siente suficientemente cómoda ni capacitada en la asistencia a NNA con PCC y/o necesidades paliativas.

Sin embargo, las EEP mostraron una probabilidad mayor a sentirse cómodas atendiendo a este colectivo, comparando con las EG. Además, las EEP refirieron sentirse significativamente más capacitadas en procedimientos específicos de cuidados paliativos (manejo de dispositivos, bombas, VMNI y aspiración de secreciones) en comparación con las EG.

